

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 ENCODE 2014

Resultados Nacionales



AGRADECIMIENTOS

A la Secretaría de Salud

A la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación Estatales

Agradecemos a los subsecretarios de Planeación, de Educación Media Superior y de Educación Básica, que a través de sus representantes, Cynthia María Elizabeth Cabrera Cárdenas, Georgina Islas Puente, Paula Villaseñor Torres y Sergio Fernández Vargas Téllez,

Coordinados por el Mtro. Antonio Ávila,

Al Mtro. Raúl Martín del Campo quien coordinó también la encuesta como parte del CONADIC, así como al Dr Ricardo Nanni y el Lic. José Oliver. Galeana

Al equipo de la Unidad de Encuestas y Análisis de Datos del INP Marycarmen Bustos, Natania Oliva, Diana Fregoso, Clara Fleiz, Jessica Merino, Roxana Mujica, Michelle Bretón, Esbehidy Reséndiz, Sayuri Soto y Vianey Cañas.

Al Dr. Mario Gómez Espinosa asesor en la clasificación de sustancias

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes

¿Por que una encuesta en estudiantes?

- ✓ Variaciones estatales
- ✓ Población de niños y adolescentes – nuestro principal foco de prevención
- ✓ Predice lo que se ve más tarde en otras poblaciones
- ✓ Grandes Números
- ✓ Análisis complejo

Metodología

Encuesta: Estudiantes con representación a nivel *nacional y estatal* + 9 ciudades específicas del país.

Niveles educativos: 5º y 6º de primaria, en secundaria y bachillerato

Escuelas públicas y privadas

Población rural y urbana.

Objetivo general:

Evaluar la **prevalencia** y las **tendencias** del consumo de drogas ilegales drogas médicas usadas fuera de prescripción, alcohol y tabaco y **conductas asociadas**.

Diseño de muestra:

Estratificado y por conglomerados,

Variables de

estratificación: Nivel educativo, Estado y ciudades

Tamaño de muestra:

En cada estrato

±1,560 entrevistas completas

No respuesta del 20%

3,750 en cada ciudad o estado

250 encuestadores capacitados -transmitir instrucciones que garantizaran a los estudiantes la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas.

Muestra Nacional - 52,171 5º y 6º de primaria,

57,402 Secundaria y

56,962 Bachillerato.

2 cuestionarios: 5º y 6º de *primaria* –
Secundaria y bachillerato, 4 formas con
diversas secciones de interés;

Secciones: *Ambos:*

Datos *sociodemográficos*,

Consumo de tabaco, alcohol y sustancias ilegales,

Problemas relacionados con el consumo

Factores asociados de los ámbitos social,
interpersonal y personal.

En primaria: habilidades sociales.

En secundaria y bachillerato –*Sintomatología depresiva,*
conductas alimentarias de riesgo, aspectos relacionados con su
escuela, maltrato, inicio de relaciones sexuales, etc.

ALCOHOL



Hombres

Mujeres

Cerveza

42

39


Alcohol Puro

10

8

	Hombres	Mujeres
Cerveza	42	39
Alcohol Puro	10	8

Prevalencia del Consumo de Alcohol por Sexo



5º y 6º de Primaria

3.3%

1.4%


2.4%

■ Total


■ Último Año

■ Consumo Excesivo de Alcohol

Prevalencia del Consumo de Alcohol por Edad




Necesidades de Atención por Consumo de Alcohol




Riesgo Alto

2.0%	1.2%
N=102,833	N=64,597



Riesgo Bajo

12.2%	9.6%
N=632,693	N=502,669



Riesgo Medio

2.4%	1.6%
N=124,504	N=81,807



Sin Riesgo

83.5%	87.6%
N=4,339,972	N=4,596,630

Prevalencia de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

	Alcohol AV %	Alcohol UA %	Alcohol UM %	Consumo Excesivo de Alcohol %	Consumo Problemático %
Prevalencia Nacional	53.2	35.5	26.3	14.5	14.4
Aguascalientes	53.1	36.1	27.4	14.5	14.9
Baja California	42.7	26.5	19.6	11.1	10.6
Baja California Sur	49.9	31.8	22.0	13.5	12.2
Campeche	48.3	29.3	20.5	11.0	10.7
Chiapas	40.1	24.4	17.0	9.4	9.7
Chihuahua	53.3	35.0	27.1	16.9	15.9
Coahuila	50.3	34.2	26.4	16.5	14.8
Colima	55.8	38.2	29.7	17.0	14.8
Distrito Federal	65.8	46.9	35.3	19.5	19.3
Durango	54.8	37.6	28.8	17.7	16.5
Estado de México	60.7	41.7	31.2	16.7	17.1
Guanajuato	56.5	37.5	28.5	16.0	15.4
Guerrero	46.8	31.4	22.7	11.3	13.7
Hidalgo	52.7	37.0	27.6	16.0	16.1
Jalisco	61.4	41.5	31.8	17.4	17.1
Michoacán	59.6	42.9	32.5	18.7	19.1
Morelos	56.8	39.0	28.6	14.9	14.8
Nayarit	51.5	33.5	25.0	13.7	13.7
Nuevo León	43.8	29.3	22.3	13.1	11.9
Oaxaca	47.3	28.6	18.8	9.6	10.7
Puebla	55.5	36.6	27.0	14.3	14.8
Querétaro	54.3	36.4	27.8	15.1	13.9
Quintana Roo	53.1	32.4	23.3	11.8	11.7
San Luis Potosí	49.7	32.9	24.4	13.5	13.9
Sinaloa	43.2	27.1	18.6	11.0	9.5
Sonora	42.3	27.3	20.4	11.8	10.8
Tabasco	42.2	27.3	19.2	11.1	11.0
Tamaulipas	44.2	27.6	20.2	10.5	10.4
Tlaxcala	59.9	42.4	31.1	16.5	15.5
Veracruz	48.1	30.0	20.6	10.5	11.1
Yucatán	46.2	28.0	20.1	10.2	9.6
Zacatecas	55.1	37.1	28.0	15.1	14.9



Arriba de la prevalencia nacional



Igual a la prevalencia nacional



Debajo de la prevalencia nacional


Prevalencia de Consumo de Alcohol en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

	Alcohol AV %	Alcohol UA %	Alcohol UM %	Consumo Excesivo de Alcohol %	Consumo Problemático %
Prevalencia Nacional	53.2	35.5	26.3	14.5	14.4
Acapulco	48.7	31.1	21.7	11.7	12.2
Apatzingán	52.3	35.8	25.5	14.7	13.4
Cancún-Playa del Carmen	56.0	34.0	24.6	11.8	11.3
Ciudad del Carmen	54.6	32.7	22.7	12.0	11.9
Ciudad Juárez	51.1	31.7	22.9	12.3	11.5
Cuautla	58.0	38.9	27.9	14.4	14.9
Ecatepec	58.1	40.6	30.3	16.0	16.2
Guadalajara	62.7	43.4	32.8	18.2	17.0
Tijuana	46.6	27.5	19.5	10.6	9.8

 Arriba de la prevalencia nacional
  Igual a la prevalencia nacional
  Debajo de la prevalencia nacional


Tendencias de Consumo de Alcohol en Estudiantes

23 años




Prevalencia Último Año de Alcohol

Norte y Centroamérica




América del Sur



TABACO


56% de los fumadores compra cigarros en las tiendas

Prevalencia del Consumo de Tabaco por Sexo




■ Total
 ■ Último Año
 ■ Último Mes
 ■ 100 cigarrillos
 ■ Consumo Diario

Prevalencia del Consumo de Tabaco por Edad




Fumadores Diarios que Consumen su Primer Cigarro en los Primeros 30 minutos Después de Despertar por Sexo



Tolerancia Social y Percepción de Riesgo de Consumir Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

Es peligroso consumir...



Prevalencia de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

	Tabaco AV	Tabaco UA	Tabaco UM	Consumo Diario	100 Cigarros o Más
	%	%	%	%	%
Prevalencia Nacional	30.4	17.3	11.1	7.4	4.2
Aguascalientes	31.9	18.3	10.9	7.0	3.3
Baja California	22.9	11.3	6.3	3.5	3.4
Baja California Sur	26.3	14.6	8.1	4.8	3.5
Campeche	27.3	14.6	9.1	5.5	4.0
Chiapas	22.8	11.3	7.5	5.5	2.7
Chihuahua	29.9	16.8	11.1	6.9	4.6
Coahuila	33.9	19.2	13.4	8.9	5.5
Colima	26.1	14.1	8.6	5.7	3.8
Distrito Federal	39.9	25.8	17.2	11.1	6.7
Durango	32.8	17.6	11.4	8.1	4.5
Estado de México	36.6	22.1	14.5	9.6	5.4
Guanajuato	30.8	17.1	11.1	7.9	4.2
Guerrero	31.6	15.2	10.6	7.9	3.2
Hidalgo	29.4	18.5	11.6	7.3	4.5
Jalisco	32.1	17.2	10.7	7.1	4.1
Michoacán	31.6	18.5	12.4	8.9	3.9
Morelos	33.9	20.2	13.6	9.6	4.6
Nayarit	23.2	12.6	7.9	4.9	3.7
Nuevo León	29.3	17.4	10.9	7.0	4.6
Oaxaca	26.3	13.3	7.7	5.5	2.4
Puebla	29.1	17.0	9.8	6.5	3.7
Querétaro	32.3	19.1	12.7	8.4	4.8
Quintana Roo	32.1	17.4	10.8	7.1	4.9
San Luis Potosí	26.8	14.7	9.1	5.8	3.0
Sinaloa	15.1	8.4	4.6	2.5	2.0
Sonora	26.2	13.1	8.1	4.7	3.8
Tabasco	22.3	11.1	6.7	4.3	2.8
Tamaulipas	25.2	13.1	8.6	6.2	3.7
Tlaxcala	33.8	19.7	12.4	8.6	3.8
Veracruz	25.9	14.7	8.4	6.0	2.5
Yucatán	29.3	17.0	11.5	8.4	4.8
Zacatecas	30.3	16.8	10.8	7.7	4.0

■ Arriba de la prevalencia nacional
 ■ Igual a la prevalencia nacional
 ■ Debajo de la prevalencia nacional


Prevalencia de Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

	Tabaco AV %	Tabaco UA %	Tabaco UM %	Consumo Diario %	100 Cigarros o Más %
Prevalencia Nacional	30.4	17.3	11.1	7.4	4.2
Acapulco	32.2	14.9	10.2	6.8	3.0
Apatzingán	22.4	10.8	6.1	4.4	1.6
Cancún-Playa del Carmen	32.8	17.7	11.0	7.3	5.1
Ciudad del Carmen	31.2	16.7	10.3	6.4	4.3
Ciudad Juárez	27.1	13.8	8.9	5.4	3.7
Cuautla	37.4	22.5	14.8	10.1	6.7
Ecatepec	36.2	22.4	15.9	11.7	5.1
Guadalajara	34.9	19.9	11.8	7.0	4.9
Tijuana	21.7	11.3	5.6	3.0	3.2

 Arriba de la prevalencia nacional
  Igual a la prevalencia nacional
  Debajo de la prevalencia nacional


Tendencias de Consumo de Alcohol en Estudiantes

23 años




Prevalencia Último Año de Alcohol

Norte y Centroamérica




América del Sur




CONSUMO DE DROGAS EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO


Gráfica 1: Prevalencia del Consumo de Cualquier Droga por Sexo




Exposición y Consumo de Drogas Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato a Nivel Nacional



Consumo de Drogas Ilegales Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato a Nivel Nacional








Consumo de Drogas Médicas Según Sexo en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato a Nivel Nacional




Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato a Nivel Nacional Según Sexo

Total Nacional = 17.2%
IC 95% 16.715-17.745

-  Estados con % más altos
-  Estados con % en el promedio
-  Estados con % más bajos



Hombres Nacional = 18.6%
IC 95% 17.960-19.241



Mujeres Nacional = 15.9%
IC 95% 15.242-16.500

Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

	Mariguana	Cocaína	Crack	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
	%	%	%	%	%	%	%
Prevalencia Nacional	10.6	3.3	1.6	1.9	5.8	2.0	.9
Aguascalientes	9.6	2.5	1.4	1.9	5.4	2.3	0.5
Baja California	9.4	2.5	1.0	1.1	3.7	2.0	0.9
Baja California Sur	10.0	1.8	0.9	0.8	4.0	1.2	0.5
Campeche	8.7	3.4	1.7	1.2	4.8	1.5	1.2
Chiapas	5.5	3.0	1.5	0.8	4.1	1.5	1.3
Chihuahua	11.9	4.4	1.3	1.9	5.1	2.6	0.8
Coahuila	9.9	2.2	0.7	1.9	4.6	1.1	0.6
Colima	10.9	3.0	1.1	1.8	3.9	2.8	0.8
Distrito Federal	18.2	5.2	2.7	3.8	8.0	3.2	1.3
Durango	8.8	2.8	1.1	1.2	5.2	1.8	0.6
Estado de México	13.8	4.2	2.3	3.1	8.8	2.7	0.8
Guanajuato	11.6	3.6	1.9	1.7	6.9	2.4	0.8
Guerrero	8.3	3.6	2.1	1.3	5.2	1.6	1.2
Hidalgo	9.4	3.2	1.8	1.8	6.3	1.4	0.9
Jalisco	12.4	2.9	1.3	2.4	6.3	2.4	0.6
Michoacán	10.0	3.0	1.3	2.1	5.8	2.1	1.1
Morelos	12.3	3.1	1.4	2.1	6.2	1.8	1.1
Nayarit	9.8	2.8	1.1	2.0	4.0	2.5	1.0
Nuevo León	8.6	2.4	1.5	1.3	5.0	1.5	0.8
Oaxaca	8.5	3.0	1.1	1.4	6.0	1.3	0.9
Puebla	8.5	3.1	1.7	1.7	5.2	1.5	0.7
Querétaro	12.5	3.1	2.0	1.9	7.3	2.0	0.5
Quintana Roo	14.6	4.7	2.7	1.5	5.5	2.0	1.1
San Luis Potosí	10.1	2.5	1.1	2.6	5.5	1.6	0.5
Sinaloa	4.9	1.6	0.5	0.5	1.9	1.2	0.7
Sonora	8.9	2.2	0.7	0.4	2.7	1.5	0.3
Tabasco	5.8	2.7	1.6	1.0	2.6	1.2	0.9
Tamaulipas	8.8	4.1	1.4	1.0	4.0	1.8	1.3
Tlaxcala	7.0	2.7	1.6	1.3	4.8	1.4	0.8
Veracruz	7.5	2.7	1.4	1.5	6.1	1.5	0.9
Yucatán	8.9	2.7	2.0	1.0	4.9	1.2	0.7
Zacatecas	7.1	2.2	0.7	1.1	3.4	0.9	0.2

■ Arriba de la prevalencia nacional
 ■ Igual a la prevalencia nacional
 ■ Debajo de la prevalencia nacional


Prevalencia de Consumo de Drogas Ilegales en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

	Mariguana	Cocaína	Crack	Alucinógenos	Inhalables	Metanfetaminas	Heroína
	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
	%	%	%	%	%	%	%
Prevalencia Nacional	10.6	3.3	1.6	1.9	5.8	2.0	.9
Acapulco	10.8	3.0	2.3	1.6	6.8	1.7	.8
Apatzingán	6.9	1.6	.6	.6	2.4	.9	.4
Cancún-Playa del Carmen	15.1	4.4	2.4	1.7	6.2	1.8	.9
Ciudad del Carmen	10.7	4.6	2.2	1.9	4.9	2.1	1.2
Ciudad Juárez	12.3	3.3	1.3	1.8	5.6	2.7	.7
Cuautla	15.0	4.3	2.0	3.2	6.8	2.2	1.1
Ecatepec	16.1	4.8	2.7	3.2	8.6	2.7	1.1
Guadalajara	14.1	3.2	1.5	2.8	6.1	2.7	.7
Tijuana	9.8	2.8	1.0	1.0	4.2	1.9	.8


 Arriba de la prevalencia nacional
  Igual a la prevalencia nacional
  Debajo de la prevalencia nacional

CONSUMO DE DROGAS EN PRIMARIA




Consumo de Marihuana, Inhalables y Otras Drogas en Estudiantes de Primaria a Nivel Nacional



Consumo de Cualquier Droga Alguna Vez en Estudiantes de Primaria a Nivel Nacional



Total Primaria = 3.3%
IC 95% 3.006-3.495

-  Estados con % más altos
-  Estados con % en el promedio
-  Estados con % más bajos

Prevalencia de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

	Mariguana Alguna Vez %	Mariguana Último Año %	Mariguana Último Mes %	Inhalables Alguna Vez %	Inhalables Último Año %	Inhalables Último Mes %
Prevalencia Nacional	2.3	1.8	1.3	1.8	1.6	1.1
Aguascalientes	2.5	2.1	1.4	1.6	1.4	1.2
Baja California	2.8	2.4	1.8	2.5	2.4	1.6
Baja California Sur	1.7	1.3	1.2	1.3	0.9	0.6
Campeche	3.5	2.7	2.0	2.8	2.5	1.9
Chiapas	2.3	1.8	1.2	2.0	1.6	1.1
Chihuahua	2.6	1.8	1.1	1.8	1.5	1.1
Coahuila	2.1	1.6	1.2	1.6	1.0	0.7
Colima	3.3	2.7	1.9	2.3	1.9	1.5
Distrito Federal	1.8	1.5	1.1	1.0	1.0	0.5
Durango	3.1	2.1	1.6	2.1	1.9	1.4
Estado de México	1.5	1.4	0.6	1.7	1.4	0.8
Guanajuato	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	0.3
Guerrero	4.0	3.1	2.7	2.9	2.6	1.9
Hidalgo	1.8	1.3	0.9	2.4	1.7	1.1
Jalisco	3.3	2.5	2.0	1.9	1.7	1.4
Michoacán	4.1	3.2	2.3	2.7	2.5	1.8
Morelos	2.6	2.1	1.7	2.0	1.6	1.1
Nayarit	1.7	1.5	1.1	1.8	1.3	0.9
Nuevo León	2.3	1.8	1.3	1.9	1.6	1.3
Oaxaca	2.5	1.9	1.4	1.8	1.2	1.0
Puebla	1.7	1.6	1.1	1.0	1.0	0.7
Querétaro	3.0	2.7	2.0	2.7	2.5	1.8
Quintana Roo	4.5	3.6	2.6	3.4	3.1	2.4
San Luis Potosí	3.5	2.6	2.0	2.5	2.3	1.8
Sinaloa	2.3	1.9	1.2	1.6	1.4	0.9
Sonora	1.8	1.4	0.9	2.9	2.6	1.2
Tabasco	3.2	2.7	1.9	2.9	2.7	1.9
Tamaulipas	2.2	1.5	0.9	1.7	1.4	1.1
Tlaxcala	2.1	1.5	0.7	1.7	1.4	0.8
Veracruz	1.7	1.2	1.0	1.8	1.5	1.2
Yucatán	3.1	2.8	2.1	2.2	1.9	1.3
Zacatecas	2.0	1.6	1.2	1.3	1.1	0.8

■ Arriba de la prevalencia nacional
 ■ Igual a la prevalencia nacional
 ■ Debajo de la prevalencia nacional

Prevalencia de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

	Mariguana Alguna Vez %	Mariguana Último Año %	Mariguana Último Mes %	Inhalables Alguna Vez %	Inhalables Último Año %	Inhalables Último Mes %
Prevalencia Nacional	2.3	1.8	1.3	1.8	1.6	1.1
Acapulco	4.0	3.5	3.0	2.9	2.7	2.1
Apatzingán	5.6	5.1	4.4	4.8	3.9	2.7
Cancún-Playa del Carmen	3.3	2.8	2.0	2.8	2.5	1.5
Ciudad del Carmen	5.3	4.5	3.1	4.2	3.9	3.2
Ciudad Juárez	3.4	2.5	1.7	2.2	1.9	1.4
Cuautla	3.1	2.3	1.8	2.7	2.3	1.8
Ecatepec	2.4	2.0	1.4	2.3	2.0	1.3
Guadalajara	3.0	2.1	1.4	1.3	0.9	0.6
Tijuana	2.8	2.4	2.0	2.3	2.1	1.5



Arriba de la prevalencia nacional




Igual a la prevalencia nacional



Debajo de la prevalencia nacional


Necesidades de Atención por Consumo de Drogas



Requiere Tratamiento

1.5%
N=79,878


1.0%
N=51,380



Requiere intervención breve

6.2%
N=321,863

5.0%
N=260,842



No requiere tratamiento


92.3%
N=4,804,243

94.1%
N=4,937,608


Necesidades de Apoyo o Tratamiento en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato a Nivel Nacional Según Sexo

Total Nacional = 6.8%
IC 95% 6.501-7.156

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos



Hombres Nacional = 7.7%
IC 95% 7.294-8.139




Mujeres Nacional = 5.9%
IC 95% 5.562-6.332



*Datos obtenidos con la escala de drogas del ASSIST.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.



Tendencias en 23 años de Consumo de Drogas en Estudiantes





Prevalencia Último Año de Marihuana




Prevalencia Último Año de Inhalables




Prevalencia Último Año de Cocaína




Relación entre Consumo de Mariguana y Percepción de Riesgo





Relación entre Consumo de Marihuana y Tolerancia Social del Mejor Amigo ante el Consumo de Drogas





Tendencias de Percepción de Riesgo y Consumo de Marihuana en Estudiantes de la Ciudad de México



Relación entre Diferentes Conductas y el Consumo de Marihuana y Otras Drogas



Relación entre Diferentes Conductas y el Consumo de Marihuana y Otras Drogas



Lecciones aprendidas

Alcohol

- Principal problema. Consumo excesivo
- Inicio temprano
- Aumenta consumo en las mujeres
- Proporción importante requiere tratamiento

Tabaco

- Estable en hombres
- Aumenta en mujeres
- Percepción de riesgo importante predictor

Variaciones estatales

Consideraciones Finales

- **Incluir a la cerveza en las medidas de prevención**
- **Incrementar percepción de riesgo**
- **Alertar a padres de familia**
- **Disminuir disponibilidad – precios/impuestos**
- **Restringir acceso a los niños y adolescentes**
- **Vigilar prácticas que promueven el consumo excesivo**
- **Cuidar publicidad**
- **Prevención basada en evidencia**
- **Tratamiento**

Consideraciones Finales

Se deben mejorar las acciones en torno a una Política Nacional de Prevención de manera que:

A) Haya una mejor y mayor integración de los programas de prevención.

B) Se enfoque a trabajar más con los niños de preescolar y primaria.

C) Fomentar con los padres de familia y maestros mejores prácticas de parentalidad y disciplina.

D) Permita la Integración de equipos de investigación que evalúen las propuestas de prevención para un mayor éxito.

Consideraciones Finales

E) Se integre a la Comunidad en el eje de la prevención, sea escuela, centro de salud, casas hogares o albergues o las casas de cultura, a fin de involucrarla y hacerla parte de la instrumentación de estas acciones.

De la misma forma, hay que incidir sobre el establecimiento de una política social y de salud más equitativa que de mejores oportunidades a la población general y que amplíe y consolide los mecanismos de apoyo y participación a la población.



Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Centro de Información en Salud Mental y Adicciones

cisma@imp.edu.mx

www.inprfm.org.mx

UNIDAD DE ENCUESTAS

<http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/>

